16.1	1 p	Oddziaływanie grawitacyjne, elektromagnetyczne (lub elektryczne, lub elektrostatyczne), słabe (lub jądrowe słabe), silne (lub jądrowe silne)
16.2	2 p	Obliczamy stosunek F_g/F_e (lub odwrotny) dla elektronów lub innych cząstek. Dla elektronów wynikiem jest $\frac{F_g}{F_e} = \frac{Gm^2}{r^2} \cdot \frac{r^2}{ke^2} \approx 2 \cdot 10^{-43}$ (lub $\frac{F_e}{F_g} \approx 4 \cdot 10^{42}$) co potwierdza tezę. 2 pkt – poprawne obliczenie i wniosek (w wyniku dopuszczalne jest zaokrąglenie lub błąd nie przekraczający dwukrotnego) *jeśli uczeń napisze, że szacuje tylko rząd wielkości lub użyje symbolu ≈, dopuszczamy zaokrąglenie dające wynik do 10 razy większy lub mniejszy* 1 pkt – napisanie poprawnego wyrażenia na stosunek F_g/F_e (lub odwrotny)
16.3	1 p	Przemiana beta (lub β^-, lub β^+, lub β^- i β^+)
16.4	1 p	Neutrina nie są hadronami, cytat „Neutrina… podlegają tylko oddziaływaniom słabym i grawitacyjnym”