1.1	4 p	1 pkt – wykorzystanie wzoru $t = 2s/(v_k + v_0)$ 1 pkt – wykorzystanie wzoru $a = (v_k^2 - v_0^2)/2s$ lub $a = (v_k - v_0)/t$ 1 pkt – zamiana jednostek prędkości (przynajmniej raz prawidłowo) 1 pkt – obliczenie $\boldsymbol{t = 3{,}76}$ **s** (lub 3,8 s), $\boldsymbol{a = 3{,}33}$ **m/s²** (lub 3,3 m/s²)
1.2	2 p	1 pkt – wykorzystanie wzoru $f mg = ma$ 1 pkt – obliczenie f. Za prawidłowe uznajemy zarówno podstawienie $g = 10$ m/s², jak i przyjęcie wartości dokładniejszej. Uznajemy też przyjęcie $a = 3{,}3$ m/s², zależnie od tego wynik może być **od $f = 0{,}3$ do $f = 0{,}34$**.
1.3	2 p	1 pkt – wykorzystanie wzoru $f mg = mv^2/R$ 1 pkt – obliczenie v **= 9,9 m/s** (lub 10 m/s)
1.4	2 p	1 pkt – wpisanie: **przednie** 1 pkt – wpisanie: **prawe**